

Composición

Nitrógeno (N) orgánico	6,3% p/p equivalente a 7,56% p/v a 20°C
Carbono (C) orgánico	19,0% p/p equivalente a 22,8% p/v a 20°C
Aminoácidos totales	39% p/p equivalente a 46,8% p/v a 20°C
Aminoácidos libres	10% p/p equivalente a 12% p/v a 20°C
A.A.T.C.	0,86% p/p equivalente a 1,03% p/v a 20°C
Ácido fólico	0,016% p/p equivalente a 0,02% p/v a 20°C

Producto inscripto en SENASA con el n°14.826

DRIN es un producto orgánico líquido a base de aminoácidos procedentes de hidrólisis enzimática, ácido N-AcetilTiazolidin-4Carboxílico y ácido fólico. Proporcionado a la planta:

- recupera las plantas de los estreses causados por trasplante, asfixia radical, salinidad, fitotoxicidad, cambios y extremos térmicos e hídricos
- tiene una acción estimulante porque permite un ahorro de energía en los procesos de síntesis de proteínas de las plantas
- estimula el crecimiento de la vegetación y el engorde de los frutos
- reduce la caída de los frutos

Se recomienda el uso antes y después de estrés, durante el crecimiento de la vegetación, durante el engorde de los frutos.

CULTIVOS	DOSIS POR APLICACIÓN		ÉPOCAS Y RECOMENDACIONES
	FERTIRRIEGO (l/ha)	FOLIAR (l/ha)	
Viveros	1 - 1,5	0,5	3-4ª hojas y en caso de stress
Flores y ornamentales	2 - 3	0,5 - 1	Inicio de la actividad vegetativa, post trasplante y poda
Hortalizas en invernadero	-	1	Floración, cuaje, engorde frutos y en caso de estrés abiótico
Hortalizas en campo abierto y cultivos industriales	-	1 - 1,5	
Frutales, vid, cítricos, olivo	-	1 - 2	

Compatibilidad

Se puede mezclar con los agroquímicos de normal uso en agricultura. En mezcla con cobre, azufre y productos muy ricos en micronutrientes utilizar las dosis mínimas.

Características físico-químicas

Aspecto:	suspensión marrón
pH (solución acuosa 1% p/p):	7,0 ± 0,5
Densidad a 20°C:	1,20 g/ml
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/l):	200 µS/cm

Envases disponibles

- 1L: botella de plástico (15 botellas por caja)
- 5L: bidón de plástico (4 bidones por caja)